



EOC
EUROASIAN
ONLINE
CONFERENCES

ENGLAND CONFERENCE

**INTERNATIONAL CONFERENCE ON
MULTIDISCIPLINARY STUDIES AND
EDUCATION**



Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

doi • digital object
identifier

eoconf.com - from 2024



INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES AND EDUCATION: a collection scientific works of the International scientific conference – London, England, 2025. Issue 1

Languages of publication: Uzbek, English, Russian, German, Italian, Spanish

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference «**INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES AND EDUCATION**». Which took place in London , 2025.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.





СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ РАКА ПИЩЕВОДА: КОРРЕЛЯЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Садикова У.М., Жураева С.Т., Жураев Ш.Т.

Андижанский государственный медицинский институт

Введение: Современные методы диагностики и лечения рака пищевода активно развиваются, но их эффективность во многом зависит от правильной корреляции клинических симптомов и морфологических характеристик опухоли. Своевременная идентификация гистологических типов опухолей позволяет подобрать оптимальную терапевтическую тактику.

Цель: Определить взаимосвязь между клиническими проявлениями, стадией заболевания и морфологическими особенностями опухоли для повышения точности диагностики и эффективности лечения.

Материалы и методы: Анализ медицинских данных пациентов с различными формами рака пищевода. Исследовалась взаимосвязь между гистологическим типом опухоли, ее степенью дифференцировки и клиническими проявлениями (дисфагия, боль, потеря массы тела и др.).

Полученные результаты: Выявлено, что низкодифференцированные опухоли чаще ассоциируются с агрессивным клиническим течением и ранним метастазированием. Аденокарцинома, как правило, проявляется поздними симптомами, что затрудняет раннюю диагностику. Применение эндоскопической биопсии в сочетании с молекулярными маркерами позволяет повысить точность диагностики.

Выводы: Корреляция клинико-морфологических данных является ключевым элементом персонализированного подхода в лечении рака пищевода. Современные методы диагностики, такие как ПЭТ-КТ и молекулярное профилирование опухолей, позволяют повысить точность стадирования и эффективность терапии.

